



## PRIMER REGISTRO DE ANÓ GRANDE (*Crotophaga major*) EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RIBERA NORTE, SAN ISIDRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Lic. Esteban Cosme Argerich<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Juncal 1208, Capital Federal, CP 1062, Argentina. Correo electrónico: estebanargerich@fibertel.com.ar

**RESUMEN:** Se comunica el primer registro del Anó Grande (*Crotophaga major*) en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires efectuándose la descripción del mismo y de la zona del hallazgo y se discute el límite sur de su distribución y dos registros históricos previos para la provincia.

**ABSTRACT: FIRST RECORD OF THE GREATER ANI (*Crotophaga major*) IN THE RIBERA NORTE MUNICIPAL PARK, SAN ISIDRO, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA.** The first registry of the Greater Ani (*Crotophaga major*) in the Ribera Norte Municipal Natural Park, San Isidro, Buenos Aires province, taking place the description of the same and the zone of the finding.

### INTRODUCCIÓN

El Anó Grande (*Crotophaga major*) se extiende según De la Peña (1999) desde el norte de la Argentina abarcando las provincias de Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe hasta la provincia de Entre Ríos. Narosky *et al.* (2003) lo mapean como de presencia efectiva en la Argentina desde el norte hasta Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Entre Ríos y como probable o accidental en el este de Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos y norte de Buenos Aires. En Entre Ríos fueron observados seis ejemplares por Milat *et al.* (1985) y además fue citado para el Parque Nacional El Palmar (Chebez *et al.*, 1998). Además es incluida por Ochoa de Masramón (1971) y Nellar (1993) para la provincia de San Luis y Olrog (1979) la señala como ocasional para La Pampa y noreste de Buenos Aires. Sin embargo, De la Peña (1997) considera que para Santa Fe y Entre Ríos

es rara. Coincidiendo con dicha presunción, Narosky y Di Giacomo (1993) añaden que probablemente sea accidental, reportando tan solo dos registros antiguos para Buenos Aires.

El día 20 de abril de 2010 por la mañana se observó un ejemplar de esta especie en la zona de bosque ribereño integrado por sauce criollo (*Salix humboldtiana*), ceibo (*Erythrina crista-galli*) y aliso de río (*Tessaria integrifolia*), del Parque Natural Municipal Ribera Norte ubicado a orillas del Río de la Plata en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

La observación se realizó en una recorrida habitual por la zona con el objeto de observar y fotografiar aves.

### RESULTADOS

Durante la recorrida por la reserva se observó y fotografió un ejemplar de *Crotophaga major*. Durante una lenta caminata de observación, el autor escuchó una voz



**Figuras 1 y 2.** Vistas del ejemplar avistado en Ribera Norte, San Isidro, Bs. As. Foto: Esteban Argerich.

desconocida que provocó la búsqueda y lenta aproximación al lugar y el posterior encuentro de un ave negra que se encontraba posada sobre un *Salix humboldtiana* a unos 15 metros del sendero peatonal en el área de bosque ribereño. El ave estaba oculta por el denso ramaje

por lo que resultaba muy difícil observarla y fotografíarla. Finalmente se movió un poco permitiendo una mejor visión y posibilitando al autor sacar algunas fotos. Luego de una espera de unos cuantos minutos el ave no se movía del lugar por lo que se intentó la aproximación,

frente a lo cual el ejemplar voló con dirección al Río de la Plata para luego volver a ser avistada.

Para la identificación de la especie se recurrió a confrontar las fotos con material publicado y consultas al guardaparque de la reserva Ricardo Camiña y al naturalista Juan Carlos Chebez.

En una de las imágenes se reconoce el característico iris blanco oliváceo que confirma la identificación de la especie, al igual que la característica forma del pico. La falta o escasez del brillo violáceo podría atribuirse a las malas condiciones de luz o bien a que el ejemplar fuera un juvenil. Es interesante señalar que su aparición se produjo inmediatamente después de una fuerte tormenta lo que podría explicar su desplazamiento a esta zona desde las riberas del río Uruguay o el cercano delta del Paraná.

El *Crotophaga major* parece tener una distribución más amplia de lo que se suponía y resulta muy interesante advertir que ya en los manuscritos de William H. Partridge comentados por Chebez (1993) adelantaba que esta especie resulta abundante, pero siempre a lo largo de bosquecillos marginales de arroyos y ríos en la provincia de Misiones. Coincidiendo con el ambiente en el que se ha descubierto a dicho ejemplar.

Los únicos datos anteriores de Buenos Aires son comentados por Narosky y Di Giacomo (1993): "Probablemente accidental. Sólo dos registros: Barracas al Sur (Hartert y Venturi, 1909); un ejemplar obtenido en Cambaceres, en mayo de 1975 (piel en el MACN)". Barracas al Sur corresponde a Avellaneda y podría también interpretarse como ribereño, siendo sorprendente el de Cambaceres, partido de 9 de Julio en plena región pampeana. Evidentemente es un registro también otoñal y podría corresponder con algún tipo de transgresión postreproductiva de individuos jóvenes, siendo interesante estudiar las fechas del registro puntano y el pampeano si se comprobaran. Es interesante destacar que para la provincia de Córdoba, relativamente bien conocida desde el punto de vista ornitológico, la especie nunca fue detectada y ni siquiera citada como hipotética.

El lugar del hallazgo destaca el sitio más austral hasta ahora conocido de su tradicional distribución con datos actualizados, aunque es muy probable que si llegó hasta aquí aparezca en otras reservas costeras, llamando la atención la fecha pues en otoño debería desplazarse al

norte del continente (Narosky e Yzurieta, 2003). Dado que la especie no tiene interés ornamental y no se conoce su mantenimiento en cautiverio ni como mascota se descarta que estos datos se deban a dispersión por antropocoria.

## AGRADECIMIENTOS

A Juan Carlos Chebez por su ayuda y la difusión de esta noticia. A Ricardo Camiña y Manuela Moreyra por su atención en la determinación y difusión del hallazgo.

## BIBLIOGRAFIA

- CHEBEZ, J.C.1993.** Los Manuscritos de William Henry Partridge en Aves misioneras (VII). Nuestras Aves (28): 14-16, AOP, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C.,N.R.REY, M.BABARSKAS y A.G. DI GIACOMO.1998.** Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía L.O.L.A N° 12, Buenos Aires
- DE LA PEÑA.1997.** Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía N° 15, Edit. L.O.L.A., Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, 1999.** Aves Argentinas, Lista y Distribución. Monografía N° 18. Edit. L.O.L.A., Buenos Aires.
- MILAT, J. F. MOSCHIONE y J. KLIMAITIS. 1985.** Azor Variado, Tachurí Coludo y Anó Grande en Entre Ríos. Nuestras Aves (6): 6-7, AOP, Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y A. DI GIACOMO.1993.** Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus.128 pág., Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A., Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003.** Guía para la Identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro, 346 pág., Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- OLROG, C.C.1979.** Nueva lista de la avifauna argentina. Ópera Lilloana 27: 1-324. Tucumán.