



## HALLAZGO DE LA GARZA CUCHARONA (*Cochlearius cochlearia*) EN EL NOROESTE ARGENTINO

Oscar Braslavsky<sup>1</sup>, Gisela Muller<sup>2</sup>, Juan Carlos Chebez<sup>3</sup> y Lucas E. Rodríguez<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hipólito Yrigoyen 264 Resistencia (3500), Chaco, Argentina.

<sup>2</sup> Guardaparque Nacional, Parque Nacional Mburucuyá C.C. 1 (3427) Mburucuyá, Corrientes, Argentina

<sup>3</sup> Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD - Universidad Maimónides, Valentín Virasoro 732 (1405BDB), CABA. Correo electrónico: elnombrador@yahoo.com.ar; guazuncho23@yahoo.com.ar

**RESUMEN:** Se cita por primera vez a la Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearia*) para el noroeste de la Argentina en base al hallazgo de un ejemplar en el Departamento Santa Victoria, noroeste de la provincia de Salta. Además se discute la circunstancia del hallazgo y el carácter probablemente accidental del mismo.

**ABSTRACT:** FINDING OF THE BOAT-BILLED HERON (*Cochlearius cochlearia*) IN THE NORTHWEST REGION OF ARGENTINA. An individual of the (*Cochlearius cochlearia*) was found in Santa Victoria Department, Northwest Salta Province, Argentina. This is the first record of this species for the Northwest region of Argentina. Besides, it is discussed the condition of the finding of presumably accidental matter.

### INTRODUCCIÓN

La presente nota da cuenta del hallazgo de un ejemplar de Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearia*) en el área de influencia del Parque Nacional Baritú, en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Dado que la especie era conocida en nuestro país sólo para la región nordeste, se consideró interesante comunicar este hallazgo aunque pueda deberse a un registro accidental o extralimital para la especie que por sus características, cuesta creer que haya pasado hasta ahora desapercibida en esta vasta región.

La garza en cuestión, presenta un aspecto bastante singular al punto que antiguamente era ubicada en una familia aparte, Cochlearidae. Últimamente se la reco-

noce como parte de la Familia Ardeidae que reúne a todas las garzas. Es una de las 15 especies citadas para la Argentina y se distingue por su aspecto compacto y algo rechoncho que recuerda en su silueta a la de la Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*) destacándose como carácter prominente el ancho pico con maxila negra y mandíbula amarilla que es bien notoria. Por encima del mismo presenta la frente blanca que se prolonga sobre los ojos a modo de pequeña ceja y una corona con plumas bien largas negras. El dorso es gris claro y el ventral acanelado más castaño en el vientre. El juvenil es parduzco con corona negra y las patas amarillentas verdosas. Según Narosky e Yzurieta (2003) es parecida a la garza bruja "en hábitos, aspecto y voz", pero es "Menor y más confiada". La especie habita ampliamente

te la Región Neotropical desde México hasta Bolivia, Paraguay, el nordeste de la Argentina y el sur de Brasil. La especie fue citada para el país por Zotta (1942), quien la señaló para Formosa, dato de carácter histórico y algo vago.

## RESULTADOS

Se encontró un ejemplar juvenil de Garza Cucharona el 4 de agosto de 2008 en el Paraje La Misión, departamento Santa Victoria, provincia de Salta. El mismo se ubica inmediatamente al norte de Los Toldos por Ruta Provincial 19 y al sur de Condado, localidad ubicada sobre el río homónimo que es el límite fronterizo con la República de Bolivia. La altura aproximada de la localidad es de 1.310 m s.n.m.

Dicha ave fue hallada y llevada a la escuela (ubicada en la misma localidad) por el alumno Ricardo Valdivieso, quien dijo haberla encontrado en el camino. El maestro, Leonel Fringes, dio aviso al personal del Parque Nacional Baritú, que se acercó al lugar tomando la decisión de llevar el ave a Los Toldos, a la sede del Parque Nacional para evaluar su evolución y posterior liberación. Se efectuaron consultas telefónicas con la Asociación Rescate Silvestre para su correcta atención veterinaria. El ejemplar permaneció en la escuela desde las 8 hasta las 15 hs, momento en que fue trasladada a Los Toldos por personal de Parques Nacionales para su observación. Finalmente y luego de brindarle las atenciones correspondientes, el ave fue encontrada sin vida a las 19:20 hs. Se tomaron fotografías y se conservó el animal congelado. El ejemplar habría sido derivado a la colección del Instituto Miguel Lillo, donde ignoramos si fue finalmente conservado e incorporado formalmente.

Esta sería la primera cita de la especie para el noroeste argentino en una zona de neta influencia yungueña, ecorregión para la cual la especie era previamente desconocida. Asimismo, es el registro más occidental para la Argentina y abre el interrogante de su presencia en el sur de Bolivia y el oeste de Paraguay, así como en la ecorregión del Chaco Occidental en nuestro país. No se descarta igualmente que se trate de un registro extralimital y de carácter accidental a lo que son muy propensas las aves acuáticas por razones climáticas y máxime por tratarse de un juvenil. En el caso de Bolivia la especie cuenta con registros en los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, pero en apariencia no en los de Chuquisaca y Tarija, inmediatos al área de estudio (Armonía, 1995). En Paraguay la especie cuenta con registros en la Zona Oriental en los Campos Cerrados, en el Paraguay Central, en el Ñeembucú y en el Alto Paraná, en todas ellas catalogada como “rara”; y en la región del Chaco, en el Bajo Chaco como “rara”, en el Mato Grosso como “escasa” y en el Alto Chaco como “ausente”.

En nuestro país fue citada para las provincias de Misiones, Chaco y Formosa con registros concretos, ha-

biendo sido citada hipotéticamente o mapeada sin dar detalles para Corrientes y Entre Ríos. Los registros chaqueños de nuestro país son todos del Chaco Oriental, donde incluso fue hallada nidificando (Chebez, 2009).

El hallazgo de la especie en una localidad remota para su distribución conocida y en un hábitat para el cual no era conocida generó primeramente en los autores y colaboradores algunas dudas acrecentadas por la incapacidad de vuelo demostrada por el ejemplar. La misma, a nuestro entender, podía deberse a razones sanitarias y no a su estado de desarrollo ya que como se observa en las fotos estaba perfectamente emplumado, sin trazas de plumón, por lo que descartamos que la colonia de nidificación necesariamente tuviera que estar cerca o en ese ámbito yungueño. Recordemos que el ejemplar no podía mantenerse en pie ni alimentarse por sus propios medios. La posible llegada al sitio por antropocoria, es decir por obra del hombre, la consideramos dudosa por la lejanía de los registros bolivianos y el remoto acceso al paraje desde la Argentina, además de no ser un ave especialmente traficada o comercializada. Existe un antecedente digno de recordar que fue el hallazgo en Tucumán en un ámbito urbano del extraño Ipequí (*He-liornis fulica*) (Olrog, 1972 y 1979) que no se volvió a repetir y que desconcertó a su autor que en un primer momento también lo consideró producto de un escape de cautiverio, situación en la que nunca esa ave acuática fue detectada. También en este caso se trataba de una especie con distribución en el nordeste y que parecía imposible de hallar en un sitio tan distante. En cuanto al hábitat del hallazgo probablemente no sea el apropiado para el desarrollo de la especie por su topografía montañosa con predominio de quebradas y ríos pedregosos con grandes pendientes donde habitan el Pato de los Torrentes (*Merganetta armata berlepschi*), el Hocó Oscuro (*Tigrisoma fasciatum palleescens*), la Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*) y la Viudita de Río (*Sayornis nigricans*) por nombrar algunas aves características de ese entorno. No obstante existen sectores bajos con pequeñas lagunas con características más chaqueñas que merecerían ser explorados en detalle e incluso el Parque Provincial Pintascayo con la laguna homónima ubicado inmediatamente al sur del Parque Nacional Baritú, cuenta con ambientes acuáticos con mayor influencia chaqueña donde habitan el yacaré ñato (*Caiman latirostris*), varias especies de garzas y cigüeñas.

Un aspecto interesante de destacar es el desconocimiento de la especie que demostraron los pobladores locales que si distinguen a la garza bruja, pero se asombraban del pico de esta especie para la que no tenían un nombre. Esto avalaría la posibilidad de un hallazgo accidental.

En averiguaciones posteriores, los guardaparques inspeccionaron el sitio exacto del posible hallazgo que además de estar distante del agua estaba bastante transformado por la actividad humana y volviendo a conversar con el maestro y el niño surgió la posibilidad que el animal hubiera sido capturado en un puesto ganadero



Vista lateral del ejemplar motivo de esta nota.



Vista superior del mismo ejemplar. Obsérvese la corona y el semicopete nuchal, la frente clara y el ancho del pico.

de una finca en la desembocadura del río Lipeo en el Bermejo, en un ambiente más bajo (550 m s.n.m), menos escarpado y donde el personal de APN ha registrado ocasionalmente presencia de otras especies de distribución chaqueña, como la Bandurria Mora (*Theristicus caerulescens*) en el 2006, el Yabirú (*Jabiru mycteria*) en el 2007 y una Cigüeña Americana (*Ciconia maguari*) volando en la zona de La Mamora en el 2008. En dicha finca trabajaba el padre del alumno que aportó el ejemplar.

#### AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento al alumno Ricardo Valdivieso y al maestro Leonel Fringes quienes suministraron la información y la atención primaria del animal que dio origen a esta nota. Es de destacar, en el segundo caso, el valioso gesto de acercarse a una participación oficial para informarse más de la especie involucrada y de como asistirle. Al personal del Parque Nacional Baritú que participó junto a uno de los autores en la atención del ejemplar y la constatación en el terreno de los detalles. Particularmente a los guardaparques Matías Entrocassi, Gretel Müller y muy especialmente a Zahida Coca por su compromiso e interés. Además a Bárbara Gasparri y Julieta Oregioni por su apoyo incondicional.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ARMONÍA.** 1995. Lista de las Aves de Bolivia. Asociación Armonía. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- CHEBEZ, J. C.** 2005. Guía de Reservas Naturales de la Argentina. 4. Noroeste. 256 págs., Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J. C.** 2009. Otros que se van. Fauna argentina amenazada. Edit. Albatros.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO.** 1998. Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Monog. LOLA N° 12. Buenos Aires.
- GUYRÁ PARAGUAY.** 2004. Lista comentada de las aves de Paraguay. Annotated checklist of the birds of Paraguay. Asociación Guyrá Paraguay, Asunción, Paraguay.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA.** 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores, Aves Argentinas/AOP, Birdlife Internacional, 346 págs., Buenos Aires.
- OLROG, C.** 1972. Notas ornitológicas VIII, sobre la colección del Instituto M. Lillo, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana XXVI: 18, Tucumán.
- OLROG, C.** 1979. Notas ornitológicas XI. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Acta Zool. Lilloana XXXIII: 5-7, Tucumán.
- ZOTTA, A.** 1942. El Pico cuchara *Cochlearius cochlearius*, nueva especie para la avifauna Argentina. Hornero 7 (2): 177-178, Buenos Aires.