

COMENTARIOS SOBRE EL PEPITERO DE COLLAR (*Saltator aurantiirostris nasica*) Y EL PEPITERO VERDOSO (*Saltator similis*) PARA EL NOROESTE ARGENTINO

Diego Ortiz^{1,2} y Rodrigo Aráoz^{1,2}

¹ Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CeRAR), Reserva Experimental Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo N° 205 (4000) Tucumán, Argentina. Correo electrónico: diegoaves@hotmail.com

² Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo N° 205 (4000) Tucumán, Argentina. Correo electrónico: cenaarg@yahoo.com

RESUMEN. El Pepitero de Collar (*Saltator aurantiirostris*) presenta cuatro subespecies, de las cuales una de ellas, el *Saltator a. nasica* presentaría una ampliación en la distribución conocida, basada en el análisis de pieles depositadas en el Instituto Miguel Lillo. Asimismo, se plantea una discrepancia respecto a la supuesta presencia del Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) para la provincia de Tucumán.

ABSTRACT. COMMENTS ON THE GOLDEN-BILLED SALTATOR (*Saltator aurantiirostris nasica*) AND GREEN-WINGED SALTATOR (*Saltator similis*) FOR THE NORTHWEST ARGENTINA. The Golden-Billed Saltator (*Saltator aurantiirostris*) has four subspecies; one of them, the *Saltator a. nasica* could present a broader distribution based on the analysis of bird's skins deposited in the Miguel Lillo Institute. Also we disagree with the assumed presence of the Green – Winged Saltator (*Saltator similis*) in Tucumán province

INTRODUCCIÓN

El Saltator aurantiirostris se distribuye ampliamente en la Argentina desde el norte del país hasta el noreste de las provincias de Río Negro y Buenos Aires y el sur de esta última (Canevari *et al.*, 1991). En nuestro país se han descripto cuatro subespecies (Hellmayr, 1938; Zotta, 1944; Contreras, 1980): *Saltator a. aurantiirostris* que se distribuye desde el este de la provincia de Jujuy, para luego extenderse por las provincias de Salta, Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y sur de Buenos Aires; *Saltator a. tilcarae* por el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca; *Saltator a. nasica* desde la norteña provincia de La Rioja, se extiende por San Juan, Mendoza, San Luis y oeste de La Pampa (De La Peña, 1999; Martín *et al.*, 2011) y finalmente *Saltator*

a. parkesi para Entre Ríos (Camperi, 1992). Uno de los caracteres más significativos para la determinación de las subespecies es la longitud del pico, es decir la longitud total del culmen.

RESULTADOS

En base al análisis de cuatro individuos existentes en la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo, comparados con dos capturados en la localidad del Pichao, en el departamento Tafi del Valle, Tucumán y uno del departamento Cachi, Salta, se pudo determinar que los tres últimos pertenecían a ejemplares de *Saltator a. nasica*, subespecie que es propia de la porción más austral del Monte y que tiene como límite norte



Foto 1. Juvenil de Pepitero Gris (*Saltator coerulescens*) fotografiado el 31 de mayo de 2007 en la localidad de Yerba Buena, departamento Yerba Buena, Tucumán (Foto: R. Aráoz).



Foto 2. Adulto de Pepitero Verdoso (*Saltator similis*), fotografiado en la provincia de Corrientes el 8 de junio de 2010 (Foto: R. Aráoz).



Foto 3. Adulto de Pepitero Gris (*Saltator coerulescens*) fotografiado en Yerba Buena, Tucumán el 13 de diciembre de 2010 (Foto: R. Aráoz).

de su distribución la provincia de La Rioja (Contreras, 1980). Dicha subespecie se diferencia por poseer el largo del culmen mayor que *Saltator a. aurantirostris* pero menor que el *Saltator a. tilcarae*. Las medidas del culmen de *Saltator a. nasica* abarcan un rango que incluye desde los 20 a los 22 mm de largo (Contreras, 1980). Los siete ejemplares analizados presentan las medidas del culmen correspondientes a la forma *Saltator a. nasica* (Figura 1). Con estos datos ampliamos significativamente la distribución de la raza para las provincias de Catamarca, Tucumán y sur de Salta.

En lo que respecta al *Saltator similis*, recientemente Brandán y Navarro (2009) señalan su presencia para la provincia de Tucumán. Sin embargo, esta especie se

distribuye en el noreste de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, Chaco, Santa Fe y noreste de Buenos Aires (De La Peña, 1999). Debido a la existencia de dicho registro, se efectuó una revisión de la bibliografía existente para Tucumán y no se hallaron antecedentes que certifiquen su presencia.-

Se estima que los registros asignados a esta especie podrían estar vinculados a confusiones con ejemplares juveniles del Pepitero Gris (*Saltator coerulescens*) que suelen presentar tonalidades verdosas en el plumaje, destacándose con mayor énfasis en las primarias (Foto 1) durante su primer año de vida, carácter ya comentado por Narosky & Yzurieta (2003). En cam-

Nº Colección o Anillo	Sexo	Culmen	Localidad	Departamento	Provincia	Fecha	Dato
Col. 14.828	I	21 mm	El Carmen	Tafi del Valle	Tucumán	15 de enero de 1985	Col. Lillo
Por ingresar	J	22 mm	El Pichao	Tafi del Valle	Tucumán	30 de mayo de 2008	Colectado
M 6.893	M	22 mm	El Pichao	Tafi del Valle	Tucumán	31 de mayo de 2008	Anillado
Col. 2.858	M	22 mm	Andalgalá	Andalgalá	Catamarca	12 de diciembre de 1945	Col. Lillo
Col. 8.432	M	22 mm	Hualfin	Belén	Catamarca	18 de octubre de 1953	Col. Lillo
Col. 8.206	H	22 mm	Cafayate	Cafayate	Salta	8 de agosto de 1953	Col. Lillo
M 6.890	M	21 mm	Cachi	Cachi	Salta	6 de diciembre de 2009	Anillado

Figura 1. Individuos analizados donde se muestran, número del ejemplar colectado, localidades, medidas del culmen, fechas, procedencia y sexo.

bio la especie *Saltador similis* presenta tonalidades verdosas en el dorso (Foto 2), y posee la ceja blanca más prolongada y conspicua que *Saltator coerulecens* (Narosky e Yzurieta, 2003) (Foto 3).

BIBLIOGRAFÍA

- BRANDÁN, Z. J. Y C. I. NAVARRO.** 2009. Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Fundación Miguel Lillo, 12-55 págs.
- CAMPERI, A. R.** 1992. Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos I. El Hornero 13: 225-229 págs.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. R. CARRIZO, G. HARRIS, J. R. MATA Y R. STRANECK.** 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Volumen I: Ordenes y familias. Fundación Acindar, Buenos Aires, Argentina.
- CONTRERAS, J. R.** 1980. Algunos comentarios sobre las razas argentinas de *Saltator aurantirostris* y revalidación de *Saltator aurantirostris tilcarae* Chapman, 1927 (Aves: Emberizidae). Historia Natural. Volumen I, Nº 17.
- DE LA PEÑA, M.** 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. Literature of Latin America (L. O. L. A.). Monografía Nº 18: 243 págs. Buenos Aires.
- HELLMAYR, C.** 1938. Catalogue of the birds of the Americas and the adjacent islands. Field Mus. Nat. Hist., 13 (11): i – iv + 1 – 662, Chicago.
- MARTÍN, S., C. ROBLEDO Y H. SOSA.** 2011. Evaluación sobre la situación poblacional del Pepitero de Collar o “siete cuchillos” (*Saltator aurantirostris nasica*), en la Reserva Natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 64. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. Y D. YZURIETA.** 2003. Guía para la identificación de aves de Argentina y Uruguay. Vázquez Mazzini Editores. 7-346 págs.
- ZOTTA, A.** 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 236 págs. Buenos Aires. Tucumán (Foto: R. Araújo).