



## Tres especies poco comunes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina

Por Ignacio Roesler. Beruti y Brown s/n (6.230) General Villegas. Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: croesler@servicoopsa.com.ar

Vuelvepedras (*Arenaria interpres*). En la provincia de Buenos Aires sólo se cuenta con registros en las costas del mar (Narosky y Di Giacomo, 1993); registrado en la época estival en la laguna Mar Chiquita, provincia de Córdoba (Nores, 1996). Un individuo, con plumaje invernal, fue observado el 25 de octubre de 1998 en la laguna Hinojo Chico, partido de Trenque Lauquen (35° 57'S; 62° 42'O), en un sector donde había pocas playas y predominaban barrancas de unos 30 cm. Se mostraba pasivo y confiado, se acercó a menos de un metro de los pescadores del lugar, a diferencia de lo descrito por la mayoría de los autores que lo consideran arisco y desconfiado (Narosky e Yzurieta, 1993; de la Peña, 1992; Olrog, 1959). Esta especie suele observarse en grupos pequeños; probablemente el de mi observación se trató de un ejemplar extraviado.

Milano tijereta (*Elanoides forficatus*). Vive en selvas, bosques y sabanas del nordeste y noroeste de la Argentina, aunque tiene algunos pocos registros para la zona de las serranías y del nordeste de Córdoba (Straneck y Casañas, 1995), y otros pocos para el noreste de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993) donde hay uno solo moderno, para Berisso (Gora, 1991). Dos ejemplares fueron vistos el 30 de octubre de 1998 en el centro de General Villegas (35° S; 63° O), a las doce del mediodía volando en círculos a una altura de aproximadamente 20 m, durante tres a cuatro minutos.

Milano plumizo (*Ictinia plumbea*). Habita bosques y selvas del norte de la Argentina (Narosky e Yzurieta, 1993). En la provincia de Buenos Aires cuenta con solamente un antiguo registro en 1936 para General Lavalle (Narosky y Di Giacomo, 1993). El 25 de noviembre de 1998

a las 10 de la mañana, un individuo adulto fue observado sobrevolando la zona céntrica de la ciudad de General Villegas. Planeaba en círculos mientras algunas palomas domésticas (*Columba livia*) volaban a su alrededor asustadas por su presencia. Se observó por aproximadamente diez a quince minutos.

Agradezco especialmente a Germán Pugnali y a Hernán Casañas por la corrección y crítica del manuscrito y a Juan García, Martín Nihany, Flavio Quiroga y Santiago Vignale por la colaboración en las salidas de campo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: DE LA PEÑA, M. R. 1992. Guía de Aves Argentinas. Tomo II. LOLA. Buenos Aires, 142 páginas. GORA. 1991. Ñacurutú, milano tijereta y boyero negro en el partido de Berisso. *Garganchillo*, 11: 13-15. NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 128 páginas. NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1993. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas. NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas. OLROG, C. 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Univ. Nac. de Tucumán e Inst. Miguel Lillo. Tucumán, 345 páginas. STRANECK, R. J. y H. CASAÑAS. 1995. El chiricote, *Aramides cajanea*, una nueva especie, y nuevos registros del gavián tijereta, *Elanoides forficatus*, en la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 71: 1-4.