

Nótulas FAUNÍSTICAS

76

Segunda Serie

Junio 2011

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

PRIMERA CITA CON INDICIOS DE NIDIFICACIÓN DE LA VIUDITA CHICA (*Knipolegus hudsoni*) PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Francisco Lucero¹

¹Ruta provincial 319 S/N, Cienaguita (5431), departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Correo electrónico francilucero@hotmail.com

RESUMEN. Se da a conocer el registro de la Viudita Chica (*Knipolegus hudsoni*) para la provincia de San Juan, aportando la ampliación de su distribución y reportando la primera manifestación de indicios reproductivos detallando la singularidad en el comportamiento en sus vocalizaciones y límites de territorio observado.

ABSTRACT. APPOINTMENT FIRST SIGNS OF NESTING OF THE HUDSON'S BLACK-TYRANT (*Knipolegus hudsoni*) FOR THE SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. Here, the Hudson's Black-Tyrant (*Knipolegus hudsoni*) is reported for the first time in San Juan province. This record constitutes an expansion of its geographic distribution, and constitutes the first observation of its unique reproductive behavior, including vocalization and delimitation of territory.

INTRODUCCIÓN

Se presenta *Knipolegus hudsoni* como nueva especie para la provincia de San Juan, se amplía su distribución en Argentina y se dan a conocer nuevos sitios de nidificación de la especie.

Knipolegus hudsoni ha sido citada para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Mendoza, Salta y Entre Ríos, [Fontana, (1908); Dabbene, (1910); Roig, (1965); Orrego Aravena (1970), Nores e Yzurieta (1981); Nores *et al.*, (1983); Chebez *et al.*, (1993); Narosky y Di Giacomo, (1993); Acerbo, (2000); Veiga *et al.*, (2005); Bodrati, (2005), De La Peña (2010)].

Citada en los diferentes trabajos publicados por Olog (1959, 1963 y 1979); en Olog y Pescetti (1991) se mapea como de paso migratorio para el Gran Cuyo sin detalle de localidades. No se cita en Camperi y Darrieu (2004) para San Juan.

Sin embargo existe un antecedente sobre la posibilidad de que nidificaría desde las provincias de Catamarca, Córdoba hasta Río Negro pero sin mencionar datos concretos (Narosky y Salvador, 1998), incluso para Buenos Aires pero solo se señala como probable nidificante en Narosky *et al.*, (1993). Está confirmada la nidificación para Neuquén (Acerbo, 2000 y Veiga *et al.*, 2005), también para la provincia de Río Negro en Agnolin *et al.*, (2009). Para Corrientes ha sido mencionada por Contreras (1987) pero sin dar detalles, también en la Reserva Provincial Campo del Cielo en la provincia de Santiago del Estero (Chebez, 2005).

Cabe destacar que en la nueva guía de Narosky e Yzurieta (2010) solo mapea a la especie como eventual migrador a la provincia cuyana, ya que sus desplazamientos hacia el norte del país abarcan varias provincias.

Con la presente nota se da a conocer que la provincia de San Juan no solo es un posible paso migratorio, sino

también de permanencia estival y de reproducción ampliando considerablemente el área de cobertura clave para la vida de este raro tiránido.

RESULTADOS

El día 13 de enero de 2011, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, en las coordenadas geográficas (32°05'22''S 68° 38' 11'' O) a 648 m s.n.m., se realiza el seguimiento de cinco ejemplares machos de *Knipolegus hudsoni*.

Cada ejemplar defendía un territorio de aproximadamente un cuarto de hectárea constituido por algarrobo dulce (*Prosopis flexuosa*), atamisque (*Capparis atamisquea*), chañar (*Geoffroea decorticans*), algarrobo alpataco (*Prosopis alpataco*), llaullín (*Lycium chilense*), llaullín espinudo (*Lycium gilliesianum*), zampa (*Atriplex lampa*) y algunas cactáceas tales como pencas (*Cereus aethiops*) y (*Opuntia sulphurea*), entre otras, a orillas de un arroyo de vertiente con abundante vegetación de pájaro bobo (*Tessaria absinthioides*) y chilca (*Baccharis salicifolia*).

El día 23 de enero de 2011, en matorrales densos de algarrobo (*Prosopis flexuosa*, *Prosopis alpataco*), jume (*Allenrolfea vaginata*), a orillas de la Laguna del Toro, (32° 05'49''S 68° 19' 47'' O) a 540 m s.n.m. se observan tres ejemplares macho de *Knipolegus hudsoni* vocalizando, convirtiéndose es el segundo sitio detectado en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan, distante 30 km del lugar anterior.

Es de destacar y comentar el comportamiento que esta especie realiza al vocalizar. El ejemplar macho utiliza en los despliegues aéreos al menos dos atalayas en su pequeño territorio desde los cuales vocaliza. Estos

apostaderos en general se observaron en las ramas más altas desprovistas de hojas de *Prosopis flexuosa* y de *Capparis atamisquea*. En cada apostadero tiene al menos una rama principal y otra secundaria. La composición del canto costa de una serie de breves pispeos (3 a 4) y seguido de un trino más prolongado.

Desde la rama principal el ave realiza su primera vocalización y vuela a la segunda rama ubicada en general a una distancia de separación de 50 cm a 1,5 m, desde allí realiza otro idéntico sonido y vuela a la primera rama, allí efectúa un pequeño salto con otro similar sonido acoplado una cuarta y una última vocalización esta sí más extensa en tiempo, comportamiento diferente al observado en *Knipolegus aterrimus* y *Knipolegus striaticeps*, especies que también habitan la provincia de San Juan.

Dejando pasar cierto tiempo, vuelve a realizar el mismo proceso de vocalización de defensa y cuidado de territorio.

Los días 5 y 6 de febrero de 2011 se vuelve al primer sitio del hallazgo en la localidad de Retamito y se observa a una hembra adulta y un juvenil, confirmando el primer evento reproductivo de la especie en la provincia de San Juan.

Se observa que los ejemplares juveniles son notoriamente más acanelado que las hembras adultas y que las estrías del pecho son poco notables.

En esta campaña se observaron nidos vacíos pero no se pudo determinar si corresponden a la especie citada para su descripción.

Un resumen actualizado de su distribución puede ser consultado en Chebez (2009). Los dos registros revelados en la presente nota, completan la distribución y aportan manifestaciones de nuevos sitios de reproducción de este tiránido migratorio.



Foto 1. Ejemplar macho perchado en su atalaya de *Capparis atamisquea*, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de enero de 2011. Foto: Francisco Lucero.




Foto 2. Ejemplar mostrando su característica mancha blanca en los flancos, en Retamito, Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de enero de 2011. Foto: Francisco Lucero.



Foto 3. Hembra adulta en Retamito, Sarmiento, San Juan observada el 5 de febrero de 2011. Foto: Francisco Lucero.



Foto 4. Juvenil de *Knipolegus hudsoni* en Retamito, Sarmiento, San Juan, fotografiado el 5 de febrero de 2011. Foto: Francisco Lucero.

BIBLIOGRAFÍA

- ACERBO, P.A.** 2000. Aves del río Neuquén. Autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Autoridad interjurisdiccional de cuencas (AIC). Cipolletti, Río Negro.
- AGNOLÍN, F.L., N. R. CHIMENTO, C. FRANK y R.F. LUCERO.** 2009. Nuevos registros de aves argentinas. Nótulas Faunísticas N° 34. Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
- BODRATI, A.** 2005. Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. *Nuestras Aves* n° 50: 30-33 págs, Buenos Aires.
- CONTRERAS, J. R.** 1987 a. "Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Corrientes, República Argentina". *Historia Natural* VII (6):61-70, Corrientes.
- CHEBEZ, J. C.** 2009. Otros que se van. *Fauna argentina amenazada*. 552 págs., Editorial Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ J.C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO.** 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. *Nótulas Faunísticas* (38):1-11, Corrientes.
- DABBENE, R.** 1910. *Ornitología argentina*. Anales del Museo Nacional de Historia Natural. Serie. III, Tomo XI: 513 págs., Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M. R.** 2010 *Lista y distribución de las aves argentinas*, CD. Universidad Nacional del Litoral.
- FONTANA, L. J.** 1908. *Aves de la Región Andina* (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Talleres Penitenciaria Nacional, 16 págs., Buenos Aires.

- NAROSKY, T. y A. DI GIACOMO.** 1993. Las Aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata. Editorial Vazquez Mazzini y Literature of Latin America (L.O.L.A). Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA.** 2010. Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición total. 16ª edición. Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, 432 págs.
- NAROSKY T. y S. SALVADOR.** 1998. Nidificación de las aves argentinas *Tyrannidae*. Asociación Ornitológica del Plata. 132 págs.
- NORES, M. y D. YZURIETA.** 1981. Nuevas localidades para aves argentinas I. Historia Natural, 2 (5): 33-42 págs. Corrientes.
- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO.** 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Natural de Ciencias. 56 (1 y 2): 114 págs., Córdoba.
- OLROG, C. C.** 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Instituto Miguel Lillo. Tucumán., 345 págs.
- OLROG, C. C.** 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana IX: 1-377, Tucumán.
- OLROG, C. C.** 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII, 324 págs., Fundación Miguel Lillo, Tucumán.
- OLROG, C.C. y E. A. PES CETTI.** 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza, 160 págs.
- ORREGO ARAVENA, R.** 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Serie Folletos, 13: 1-31.
- ROIG, V.** 1965. Elenco sistemático de mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Boletín Estudios Geográficos. 49(XII): 175-227.
- VEIGA, J.O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY.** 2005. Aves de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, Lista Comentada y Distribución. Editora R y C, 186 págs. Buenos Aires.